

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
“ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I”

---

Кафедра «Высшая математика»

**Е.А. Благовещенская**

**Методические указания  
по выполнению практических заданий  
*по дисциплине*  
«АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ» (Б1.Б.13)**

для специальности  
10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем»

по специализации  
«Информационная безопасность автоматизированных систем на  
транспорте»  
Форма обучения – очная

**РАЗДЕЛ 7. ТЕОРИЯ ГРУПП И КОЛЕЦ**

Санкт-Петербург 2023

## Практическое занятие 15. Разложение абелевых групп.

**Пример 1.** Рассмотрим группу вычетов  $A = \mathbb{Z}_{15}$ . Тогда  $n = 15 = 3 \cdot 5$ ,

$A(3) = \{\bar{0}, \bar{5}, \bar{10}\}$ ,  $A(5) = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}, \bar{12}\}$ . Изоморфизм  $A(3) \oplus A(5) \rightarrow \mathbb{Z}_{15}$  можно задать следующим образом

$$(\bar{a}, \bar{b}) \rightarrow \overline{a+b}.$$

Если  $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ , то группа вычетов по модулю  $n$  раскладывается в прямую сумму примарных  $p$ -компонент следующим образом

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{\alpha_1}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_k^{\alpha_k}}.$$

**Пример 2.** Разложим группу вычетов  $\mathbb{Z}_{360}$  в прямую сумму своих примарных компонент. Поскольку  $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ , то

$$\mathbb{Z}_{360} \cong \mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_5.$$

Для того, чтобы разложить абелеву группу

$$\mathbb{Z}_{n_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_m}$$

в прямую сумму примарных циклических групп, нужно разложить каждое слагаемое этой группы.

**Пример 3.** Разложим группу

$$\mathbb{Z}_{756} \oplus \mathbb{Z}_{2250} \oplus \mathbb{Z}_{105}$$

в прямую сумму примарных циклических групп. Поскольку  $756 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ ,  $2250 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^3$ ,  $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$ , то

$$\mathbb{Z}_{756} \cong \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_{27} \oplus \mathbb{Z}_7,$$

$$\mathbb{Z}_{2250} \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{125},$$

$$\mathbb{Z}_{105} \cong \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_7.$$

Поэтому

$$\mathbb{Z}_{756} \oplus \mathbb{Z}_{2250} \oplus \mathbb{Z}_{105} \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_7 \oplus \mathbb{Z}_7 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{27} \oplus \mathbb{Z}_{125}.$$

**Пример 4.** Определим, изоморфны ли группы  $\mathbb{Z}_{15} \oplus \mathbb{Z}_{225}$  и  $\mathbb{Z}_{75} \oplus \mathbb{Z}_{45}$ .

Поскольку  $15 = 3 \cdot 5$ ,  $225 = 9 \cdot 25$ , то

$$\mathbb{Z}_{15} \oplus \mathbb{Z}_{225} \cong \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{25}.$$

Далее,  $75 = 3 \cdot 25$ ,  $45 = 5 \cdot 9$ . Поэтому

$$\square_{75} \oplus \square_{45} \cong \square_3 \oplus \square_{25} \oplus \square_5 \oplus \square_9.$$

Поскольку разложения совпадают с точностью до перестановки слагаемых, группы изоморфны.

**Пример 5.** Определим, изоморфны ли группы  $\square_9 \oplus \square_{225}$  и  $\square_{15} \oplus \square_{135}$ . Находим разложение каждой группы в прямую сумму примарных циклических групп.

$$\square_9 \oplus \square_{225} \cong \square_9 \oplus \square_9 \oplus \square_{25},$$

$$\square_{15} \oplus \square_{135} \cong \square_3 \oplus \square_5 \oplus \square_5 \oplus \square_{27}.$$

Примарные циклические группы не совпадают. группы не изоморфны.

Число неизоморфных абелевых групп порядка  $p^n$  равно числу  $p(n)$  разбиений числа  $n$  в сумму нескольких (возможно, одного) натуральных чисел

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_r, \text{ где } 1 \leq n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_r, 1 \leq r \leq n.$$

Например, существуют две неизоморфные абелевые группы порядка  $p^2$ :  $\square_{p^2}$  и  $\square_p \oplus \square_p$ .

$$p(3)=3, \text{ т.к. } 3=1+2=1+1+1.$$

$$p(4)=5, \text{ т.к. } 4=1+3=2+2=1+1+2=1+1+1+1.$$

$$p(5)=7, \text{ т.к. } 5=1+4=2+3=1+1+3=1+2+2=1+1+1+2=1+1+1+1+1.$$

**Пример 6.** Найдём число неизоморфных абелевых групп порядка 64.

Поскольку  $64 = 2^6$  и  $6 = 1+5 = 2+4 = 3+3 = 1+1+4 = 1+2+3 = 2+2+2 = 1+1+1+3 = 1+1+2+2 = 1+1+1+1+2 = 1+1+1+1+1+1$ , то  $p(6)=11$ . Поэтому существует 11 неизоморфных абелевых групп порядка 64.

**Пример 7.** Найдём число неизоморфных абелевых групп порядка 864.  $864 = 3^3 \cdot 2^5$ . Так как  $p(3)=3$ ,  $p(5)=7$ , то абелевых групп порядка 864 существует  $3 \cdot 7 = 21$ .

### Задачи.

Разложите в прямую сумму примарных циклических групп следующие группы

$$1. \square_6.$$

$$2. \square_{12}.$$

3.  $\square_{60}$ .

4. Сколько существует неизоморфных абелевых групп порядка: а) 36; б) 100; в) 64?

Выясните, изоморфны ли следующие группы.

5.  $\square_6 \oplus \square_{36}$  и  $\square_{12} \oplus \square_{18}$ ?

6.  $\square_6 \oplus \square_{36}$  и  $\square_9 \oplus \square_{24}$ ?

7.  $\square_6 \oplus \square_{10} \oplus \square_{10}$  и  $\square_{60} \oplus \square_{10}$ ?

## Практическое занятие 16. Кольцо многочленов над полем комплексных и вещественных чисел.

### ПРИМЕРЫ:

1. Найти  $f + g$ , где  $f = x^2 - 2x + 3$   $g = x^3 - 3x + 1$ .

*Решение:* Согласно определению суммы многочленов получаем:

$$f + g = (x^2 - 2x + 3) + (x^3 - 3x + 1) = (0 \cdot x^3 + x^2 - 2x + 3) + (x^3 + 0 \cdot x^2 - 3x + 1) = x^3 + x^2 - 5x + 4.$$

2. Найти  $f \cdot g$ , где  $f = x^2 + x - 1$   $g = x + 3$ .

*Решение:* По определению произведения многочленов имеем:

$$f \cdot g = (x^2 + x - 1) \cdot (x + 3) = (x^2 + x - 1) \cdot (0 \cdot x^2 + x + 3) = x^3 + 4x^2 + 2x - 3.$$

### ПРИМЕРЫ:

1. Разложить многочлен  $f$  по степеням  $x - \alpha$ , где  $f = x^5 - 3x^4 + 5x^3 - 2x^2 + 6x - 10$ ,  $\alpha = 2$ .

*Решение:* Для решения задачи применим схему Горнера. Заметим, что если многочлен  $f$  разложен по степеням  $x - \alpha$ , т.е.  $f = a_0 + a_1(x - \alpha) + a_2(x - \alpha)^2 + \dots + a_n(x - \alpha)^n$ , то  $a_0$  – остаток при делении многочлена  $f$  на  $x - \alpha$ ,  $a_1$  – остаток при делении предыдущего частного на  $x - \alpha$  и т.д.

	1	-3	5	-2	6	-10
2	1	-1	3	4	14	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18</span>
2	1	1	5	14	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">42</span>	
2	1	3	11	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">36</span>		
2	1	5	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21</span>			
2	1	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span>				
2	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>					

Получили, что  $a_0 = 18$ ,  $a_1 = 42$ ,  $a_2 = 36$ ,  $a_3 = 21$ ,  $a_4 = 7$ ,  $a_5 = 1$ , т.е.  $f = (x - 2)^5 + 7(x - 2)^4 + 21(x - 2)^3 + 36(x - 2)^2 + 42(x - 2) + 18$ .

2. Разложить по степеням  $x$  многочлен  $f(x - 2)$ , где  $f = x^5 + x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 2x + 5$ .

*Решение:* Для решения задачи можно в многочлене  $f$  заменить  $x$  на  $x - 2$ , но эта процедура будет очень громоздка. Поэтому здесь удобно применить схему Горнера. Разложим многочлен  $f$  по степеням  $x + 2$ .

	1	1	-2	4	-2	5
-2	1	-1	0	4	-10	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25</span>
-2	1	-3	6	-8	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	
-2	1	-5	16	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-40</span>		
-2	1	-7	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30</span>			
-2	1	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-9</span>				
-2	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>					

$f = (x+2)^5 - 9(x+2)^4 + 30(x+2)^3 - 40(x+2)^2 + 6(x+2) + 25$ . Если в полученном разложении заменить  $x$  на  $x-2$ , то получится искомое разложение  $f(x-2) = x^5 - 9x^4 + 30x^3 - 40x^2 + 6x + 25$ .

### ПРИМЕРЫ:

1. Найти НОД( $f, g$ ), где  $f = x^2(x^3 - 8)$ ,  $g = x^5(x-2)^3(x+5)^2$ .

**Решение:** Многочлен  $g$  разложен на линейные множители. Осталось разложить многочлен  $f$  на вещественные неразложимые множители:  $f = x^2(x^3 - 8) = x^2(x-2)(x^2 + 2x + 4)$ . Выбирая множители, входящие в оба разложения, получаем: НОД( $f, g$ ) =  $x^2(x-2)$ .

2. Найти НОД( $f, g$ ), где  $f = x^5 - 2x^4 - 38x^3 + 4x^2 + 109x + 70$ ,  $g = (x+1)^2(x^2 - 4)^3$ .

**Решение:** Разложим многочлен  $g$  на линейные множители:  $g = (x+1)^2(x^2 - 4)^3 = (x+1)^2(x+2)^3(x-2)^3$ . Проверим по схеме Горнера, какие из этих множителей и с каким показателем степени входят в многочлен  $f$ :

	1	-2	-38	4	109	70
-1	1	-3	-35	39	70	0
-1	1	-4	-31	70	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	
-2	1	-6	-19	108		
2	1	-2	-35	0		
2	1	0	-35			

Сначала проверяем двучлен  $(x+1)$ . Оказалось, что  $f \vdots x+1$ . Поскольку этот двучлен входит в многочлен  $g$  во второй степени, то надо проверить, делится ли многочлен  $f$  на  $(x+1)^2$ , т.е. делится ли  $f_1 = f/(x+1)$  на  $(x+1)$ . Коэффициенты частного уже есть, поэтому их можно взять в качестве нового заголовка схемы Горнера. В записи это отмечается проведенной под ними чертой. Видно, что и  $f_1 \vdots x+1$ . Дальнейшую делимость на  $(x+1)$  проверять уже не надо, так как многочлен  $g$  не делится на  $(x+1)^3$ . Тогда проверяем следующий двучлен  $(x+2)$ . Проверку можно вести для частного  $f_2 = f/(x+1)^2 = f_1/(x+1)$ , коэффициенты которого уже получены. Видя, что  $f_2(-2) \neq 0$ , проверяем делимость на  $(x-2)$  и получаем, что  $f_2$  (а значит, и многочлен  $f$ ) делится на  $(x-2)$ . Для проверки делимости на  $(x-2)^2$  делим новое частное на  $(x-2)$ . В итоге получаем, что

многочлен  $f$  дважды делится на  $(x+1)$  и один раз на  $(x-2)$ , следовательно, НОД  $(f, g) = (x+1)^2(x-2)$ .

**3.** Найти НОД( $f, g$ ), где  $f = x^5 + 2x^4 - 6x^3 - 20x^2 - 19x - 6$ ,  $g = x^4 + 4x^3 + 3x^2 - 4x - 4$ .

**Решение:** Поскольку не видно как разложить многочлены, то здесь удобно применить алгоритм Евклида. Делим с остатком многочлен  $f$  на многочлен  $g$ :

$$\begin{array}{r} x^5 & & & -19x & \\ \underline{-} & +2x^4 & -6x^3 & -20x^2 & -6 \\ x^5 & & & & \\ \underline{-} & +4x^4 & +3x^3 & -4x^2 & -4x \\ -2x^4 & & -9x^3 & -16x^2 & -15x \\ \underline{-} & -2x^4 & -8x^3 & -6x^2 & +8x \\ -x^3 & & -10x^2 & -23x & -14 \end{array} \left| \begin{array}{l} x^4 + 4x^3 + 3x^2 - 4x - 4 \\ x - 2 \end{array} \right.$$

Теперь надо делить многочлен  $g$  на полученный остаток. Если умножить предварительно остаток на  $(-1)$  это не поменяет НОД, но упростит вычисления.

$$\begin{array}{r} x^4 & & & -4 \\ \underline{-} & +4x^3 & +6x^2 & -4x \\ x^4 & & & \\ \underline{-} & +10x^3 & +23x^2 & +14x \\ -6x^3 & & -20x^2 & -18x \\ \underline{-} & -6x^3 & -60x^2 & -138x \\ 40x^2 & & +120x & +80 \end{array} \left| \begin{array}{l} x^3 + 10x^2 + 23x + 14 \\ x - 6 \end{array} \right.$$

Сокращаем полученный остаток на 40 и делим на него предыдущий делитель:

$$\begin{array}{r} x^3 & & & \\ \underline{-} & +10x^2 & +23x & +14 \\ x^3 & & & \\ \underline{-} & +3x^2 & +2x & \\ 7x^2 & & +21x & +14 \\ \underline{-} & 7x^2 & +21x & +14 \\ 0 & & & \end{array} \left| \begin{array}{l} x^2 + 3x + 2 \\ x + 7 \end{array} \right.$$

Очередной остаток равен нулю, следовательно, последний делитель и есть НОД  $(f, g)$ , значит,  $\text{НОД}(f, g) = x^2 + 3x + 2$ .

**4.** Найти НОД( $f, g$ ), где  $f = x^{40} + x^{35} + 1$ ,  $g = x^{35} + x^{34} + 1$ .

**Решение:** В этом случае вычисления по алгоритму Евклида будут очень громоздкими, поэтому здесь удобно воспользоваться следующим равенством:

$$d = \text{НОД}(f, g) = \text{НОД}(f - g, g), \quad f - g = x^{40} - x^{34} = x^{34}(x^6 - 1).$$

Поскольку  $x$  не входит множителем в многочлен  $f$ , то  $d = \text{НОД}(x^6 - 1, g)$

.Многочлен  $x^6 - 1$  имеет следующее разложение:

$$x^6 - 1 = \prod_{k=1}^6 (x - \varepsilon_k), \quad \text{где } \varepsilon_k \text{ — корни 6-й степени из 1. Осталось выяснить, которые из}$$

$\varepsilon_k$

являются

корнями

многочлена

$g$ .

$g(\varepsilon_k) = \varepsilon_k^{35} + \varepsilon_k^{34} + 1 = \varepsilon_k^{36}\varepsilon_k^{-1} + \varepsilon_k^{36}\varepsilon_k^{-2} + 1 = \varepsilon_k^{-1} + \varepsilon_k^{-2} + 1 = 0$ , значит,  $\varepsilon_k^2 + \varepsilon_k + 1 = 0$ , т.е.  $\varepsilon_k$  – невещественный кубический корень из 1. Т.к. кубический корень из 1 является корнем 6-й степени из 1, то общими корнями многочлена  $x^6 - 1$  и  $g$  будут  $\varepsilon$  и  $\varepsilon$  – два невещественных кубических корня из 1, а следовательно,  $\text{НОД}(f, g) = (x - \varepsilon)(x - \varepsilon) = x^2 + x + 1$ .

### 5. Найти вещественные корни многочлена

$$x^5 - (1-i)x^4 + (5+i)x^3 - (7-i)x^2 - (8-13i)x + 6 + 12i.$$

**Решение:** Пусть  $\alpha$  является вещественным корнем данного многочлена. Тогда  $\alpha^5 - (1-i)\alpha^4 + (5+i)\alpha^3 - (7-i)\alpha^2 - (8-13i)\alpha + 6 + 12i = 0$ , и ввиду вещественности  $\alpha$   $\alpha^5 - \alpha^4 + 5\alpha^3 - 7\alpha^2 - 8\alpha + 6 = 0$ ,  $\alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + 13\alpha + 12 = 0$ , т.е.  $\alpha$  есть общий корень многочленов  $f = x^5 - x^4 + 5x^3 - 7x^2 - 8x + 6$  и  $g = x^4 + x^3 + x^2 + 13x + 12$ , а значит, и корень  $\text{НОД}(f, g)$ .

Найдем  $\text{НОД}(f, g)$  с помощью алгоритма Евклида:

$$\begin{array}{r} x^5 \\ -x^4 + 5x^3 - 7x^2 - 8x + 6 \\ \hline x^5 + 12x \\ +x^4 + x^3 + 13x^2 \\ \hline -20x \\ -2x^4 + 4x^3 - 20x^2 + 6 \\ \hline -26x \\ -2x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 24 \\ \hline 6x^3 - 18x^2 + 6x + 30 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} x^4 + x^3 + x^2 + 13x + 12 \\ x - 2 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{r} x^4 \\ +x^3 + x^2 + 13x + 12 \\ \hline x^4 + 12 \\ -3x^3 + x^2 + 5x \\ \hline 4x^3 + 0x^2 + 8x + 12 \\ 4x^3 - 12x^2 + 4x + 20 \\ \hline 12x^2 + 4x - 8 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} x^3 - 3x^2 + x + 5 \\ x + 4 \end{array} \right.$$

Остаток легко раскладывается на множители:  $12x^2 + 4x - 8 = 12(x - 2/3)(x + 1)$ .

Проверим, не являются ли многочлены  $(x - 2/3)$  и  $(x + 1)$  множителями многочлена  $g$ , для чего применим схему Горнера:

	1	1	1	13	12
2/3	1	5/3	19/9	389/27	1750/81
-1	1	0	1	12	0

Итак,  $\text{НОД}(f, g) = x + 1$ , следовательно, искомый корень многочлена один и равен 1.

6. Найти  $\text{НОД}(f, g)$  и его линейное представление, если  $f = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6$ ,  $g = x^3 - 4x$ .

**Решение:** Найдем НОД( $f, g$ ) с помощью алгоритма Евклида:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccccc}
 & x^4 & & & & & & & \\
 - & +x^3 & -7x^2 & -x & & +6 & & & \\
 \hline
 & x^4 & & & & & & & \\
 & -0x^3 & -4x^2 & & & & & & \\
 \hline
 & x^3 & -3x^2 & -x & & & & & \\
 - & x^3 & -0x^2 & -4x & & & & & \\
 \hline
 & & -3x^2 & +3x & & +6 & & & \\
 \end{array} & \left| \begin{array}{c} x^3 - 4x \\ \hline x + 1 \end{array} \right.
 \end{array}$$

После первого деления получили, что  $f = (x+1)g - 3r_1$ , где  $r_1 = x^2 - x - 2$ .

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccccc}
 & x^3 & & & & & & & \\
 - & -4x & & & & & & & \\
 \hline
 & x^3 & & & & & & & \\
 & -x^2 & -2x & & & & & & \\
 \hline
 & x^2 & -2x & & & & & & \\
 - & x^2 & -x & -2 & & & & & \\
 \hline
 & & -x & +2 & & & & & \\
 \end{array} & \left| \begin{array}{c} x^2 - x - 2 \\ \hline x + 1 \end{array} \right.
 \end{array}$$

Результатом второго деления является  $g = (x+1)r_1 - r_2$ , где  $r_2 = x - 2$ .

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccccc}
 & x^2 & & & & & & & \\
 - & -x & -2 & & & & & & \\
 \hline
 & x^2 & & & & & & & \\
 & -2x & & & & & & & \\
 \hline
 & x & -2 & & & & & & \\
 - & x & -2 & & & & & & \\
 \hline
 & & 0 & & & & & & \\
 \end{array} & \left| \begin{array}{c} x - 2 \\ \hline x + 1 \end{array} \right.
 \end{array}$$

Получили, что  $\text{НОД}(f, g) = x - 2$ .

Теперь находим линейное представление НОД( $f, g$ ). Для этого выражаем  $r_2$  через  $g$  и  $r_1$ , а потом выражаем  $r_1$  через  $f$  и  $g$ :

$$r_2 = (x+1)r_1 - g = (x+1)\left(\frac{1}{3}(x+1)g - \frac{1}{3}f\right) - g = f\left(-\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}\right) + g\left(\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}\right).$$

$$\text{Таким образом, } \text{НОД}(f, g) = x - 2 = f\left(-\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}\right) + g\left(\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}\right).$$

**7.** Уничтожить иррациональность в знаменателе дроби  $\frac{2\alpha+1}{\alpha^2-2\alpha-1}$ , где  $\alpha$  – корень многочлена  $f = x^3 + 2x - 2$ .

**Решение:** Требование задачи означает, что нужно представить данную дробь в виде суммы неотрицательных и по возможности меньших степеней числа  $\alpha$  с рациональными коэффициентами. Заметим, что показатели степеней должны быть меньше  $\deg f = 3$ , т.к.  $\alpha^3$  уже можно заменить на  $-2\alpha + 2$ .

Обозначим  $g = x^2 - 2x - 1$ ,  $h = 2x + 1$ , тогда данная дробь представится в виде  $\frac{h(\alpha)}{g(\alpha)}$

. Найдем многочлены  $u$  и  $v$  такие, чтобы  $f u + g v = h$ . Тогда  $h(\alpha) = f(\alpha)u(\alpha) + g(\alpha)v(\alpha) = g(\alpha)v(\alpha)$ , т.к.  $f(\alpha) = 0$ . Следовательно,  $\frac{h(\alpha)}{g(\alpha)} = v(\alpha)$ , и задача решена.

Для решения воспользуемся алгоритмом Евклида:

$$\begin{array}{r} x^3 \\ \underline{-} \quad \quad \quad +2x \quad \quad -2 \\ x^3 \\ \underline{-} \quad \quad \quad -2x^2 \quad -x \\ \underline{-} \quad \quad \quad 2x^2 \quad +3x \quad -2 \\ \underline{-} \quad \quad \quad 2x^2 \quad -4x \quad -2 \\ \underline{\quad \quad \quad 7x} \end{array} \left| \begin{array}{c} x^2 - 2x - 1 \\ \hline x + 2 \end{array} \right.$$

$$f = g(x+2) + 7r_1, \text{ где } r_1 = x.$$

$$\begin{array}{r} x^2 \\ \underline{-} \quad \quad \quad -2x \quad \quad -1 \\ x^2 \\ \underline{-} \quad \quad \quad -2x \\ \underline{\quad \quad \quad -2x} \end{array} \left| \begin{array}{c} x \\ \hline x - 2 \end{array} \right.$$

$g = r_1(x-2) - r_2$ , где  $r_2 = 1$ . Тем самым,  $\text{НОД}(f, g) = 1$ . Найдем линейное представление  $\text{НОД}(f, g)$ :

$$r_2 = r_1(x-2) - g = \frac{1}{7}(f - g(x+2))(x-2) - g = f\left(\frac{1}{7}x - \frac{2}{7}\right) + g\left(-\frac{1}{7}x^2 - \frac{3}{7}\right).$$

$$v = \left(-\frac{1}{7}x^2 - \frac{3}{7}\right)h = \left(-\frac{1}{7}x^2 - \frac{3}{7}\right)(2x+1) = -\frac{2x^3 + x^2 + 6x + 3}{7}.$$

достаточно из многочлена  $2x^3 + x^2 + 6x + 3$  вычесть многочлен  $2f$ . Тогда

$$\frac{2\alpha + 1}{\alpha^2 - 2\alpha - 1} = -\frac{1}{7}(\alpha^2 + 2\alpha + 7).$$

### ПРИМЕРЫ:

1. Найти кратность корня  $\alpha$  в многочлене  $f = x^7 - x^6 - 6x^5 + 2x^4 + 13x^3 + 3x^2 - 8x - 4$ ,  $\alpha = -1$ .

**Решение:** Для решения задачи воспользуемся схемой Горнера:

	1	-1	-6	2	13	3	-8	-4	
-1	1	-2	-4	6	7	-4	-4	0	– первый
-1	1	-3	-1	7	0	-4	0		– второй
-1	1	-4	3	4	-4	0			– третий
-1	1	-5	8	-4	0				– четвертый

-1	1	-6	14	-18
----	---	----	----	-----

Искомая кратность равна 4.

2. Найти при каких  $a$  и  $b$  многочлен  $f = ax^7 + bx^5 - 2$  делится на  $(x-1)^2$ .

**Решение:** Условие задачи означает, что 1 – является корнем кратности не меньшей 2, что равносильно утверждению  $f(1) = f'(1) = 0$ .

Найдем  $f'$ :  $f' = 7ax^6 + 5bx^4$ , значения многочлена  $f$  и его производной  $f'$  при  $x=1$ :  $f(1) = a + b - 2 = 0$ ,  $f'(1) = 7a + 5b = 0$ , откуда  $a = -5$ ,  $b = 7$ .